

Anti-EIF3D 兔多克隆抗体

K1334632 -20°C



产品信息

蛋白质全称	真核翻译起始因子 3 亚基 D
别名	eIF3d, Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 7, eIF-3-zeta, eIF3 p66, Eif3d, Eif3s7, subunit 7 zeta, translation initiation factor eIF3 p66, AA407891, eIF3-p66
免疫原	小鼠 EIF3D 重组蛋白
Uniprot ID	O70194
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	64 kDa / 64 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 500-1: 1000

阳性样品: 肝


背景

eIF3D is a protein belonging to the largest of the eukaryotic translation initiation factor family, eukaryotic translation initiation factor-3 (eIF3). eIF3 is a multiprotein complex composed of at least 13 different subunits. eIF3D binds to the 40S ribosomal subunit and thus helps in maintaining the 40S and 60S ribosomal subunits in a dissociated state. An important role of eIF3D is the formation of the 40S initiation complex by interacting with the ternary complex of eIF2/GTP/methionyl-tRNA, and promotes mRNA binding.

储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 EIF3D 蛋白(货号 K1334632).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液, 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603